115.04.23

衛生福利部 騎縫章 食品藥物管理署

# 益膚康凝膠７．５毫克/公克（咪唑尼達）
# EFUCON GEL 7.5MG/GM (METRONIDAZOLE)

衛署藥製字 第 035869 號
須由醫師處方使用
版本日期 2026-04-23

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每克含Metronidazole 7.5 mg。

1.2 賦形劑

Propylene Glycol、Carbopol、Disodium Edetate、Methylparaben、Propylparaben、Sodium Hydroxide、Purified Water。

1.3 劑型

外用凝膠劑。

1.4 藥品外觀

透明凝膠。

2 適應症

因酒渣鼻引起發炎性丘疹、膿疱及紅腫。

3 用法及用量

3.1 用法用量

將患部洗淨後，將凝膠塗抹於患部表面形成薄層，輕輕按摩之，每日2次(早晚各一次)治療期約9週。本品僅供外用。

**4 禁忌**

- **對本劑過敏或血液疾患禁用。**
- **柯凱因氏症候群(Cockayne Syndrome)病人。**

**5 警語及注意事項**

**5.1 警語/注意事項**

- **以益膚康凝膠治療三個星期後，即有顯著的效果，並持續改善。**
- **柯凱因氏症候群(Cockayne Syndrome)病人之肝毒性：**

**曾有柯凱因氏症候群病人使用全身性metronidazole後，快速發生嚴重不可逆的肝毒 性/急性肝衰竭之個案報告，其中包含死亡案例。肝衰竭的症狀最快可能於使用藥品兩天即發生。**

**6 特殊族群注意事項**

115.04.23

衛生福利 騎縫章 食品藥物管理

6.1 懷孕

孕婦除非必要，且應小心使用。

6.4 小兒

小兒的安全性和效果尚未確立。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

若使用部位太靠近眼部，可能刺激流淚，對皮膚可能有短暫的發紅、乾燥、灼熱等刺激，但只有極少數人曾有以上不良反應產生。

8.3 上市後經驗

肝膽疾患：柯凱因氏症候群(Cockayne Syndrome)病人之肝毒性及肝衰竭。曾有柯凱因氏症候群病人使用全身性metronidazole後，快速發生嚴重不可逆的肝毒性/急性肝衰竭之個案報告，其中包含死亡案例。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下鋁管裝、塑膠罐裝、塑膠管裝。

13.2 效期

115.04.23

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

避免陽光直射，25℃以下陰涼乾燥處。

**製造廠**

寶齡富錦生技股份有限公司平鎮廠　桃園市平鎮區興隆路２６６號

**藥商**

寶齡富錦生技股份有限公司　　臺北市南港區園區街3號16樓